

Sundhed og sygelighed i regionerne (SUSY-2005)-Statens Institut for Folkesundhed, SDU aug.08

tabellen viser andelen i justeret procent *1 og signifikans *2

	Hovedstaden		Sjælland		Syddanmark		Midtjylland		Nordjylland	
	justeret %	sig.	justeret %	sig.	justeret %	sig.	justeret %	sig.	justeret %	sig.
Sundhed og helbredsrelateret livskvalitet										
Virkelig godt el. godt selv vurderet helbred	81,6	(+)	79,3		78,9		80,7		77,7	(-)
Godt psykisk velbefindende	47,5	(-)	51,5		54,6	(+)	53,0		53,1	
Føler sig meget vital	31,5	(-)	35,6		36,5		35,2		37,1	(+)
God mobilitet blandt ældre (60-årige og over)	68,1		69,2		68,0		67,8		65,5	
20 el. flere egne tænder tilbage	87,2	(+)	83,8	(+)	81,8	(-)	82,2		78,4	(-)
Sygelighed										
Voksne med langvarig/ kronisk sygdom	39,2		38,1		40,9	(+)	37,0	(-)	39,6	
Meget hæmmet af langvarig sygdom	9,6	(-)	12,1		11,9		10,3		12,4	(+)
Børn med en el. flere langvarige sygdomme	10,5		10,7		11,5		11,1		12,7	
Har allergi	24,2	(+)	21,1		20,7		19,3	(-)	19,1	(-)
Har sukkersyge/ diabetes	3,9		4,0		3,4		3,4		3,6	
Har ryggsygdom	14,1		17,4	(+)	15,4		14,0	(-)	15,7	
Har slidgigt og/ el. leddegigt	16,4	(-)	19,9		20,5	(+)	17,3	(-)	20,4	(+)
Udsat for ulykke el. uheld inden for 12 mdr. (uden for arbejdspladsen)	12,7	(+)	9,5		9,2	(-)	10,1		9,6	
Sundhedsadfærd										
Tillægger egen indsats for helbredet særdeles vigtig betydning	77,5	(+)	65,0	(-)	68,3		71,2	(+)	63,7	(-)
Svært overvægtige	9,5	(-)	14,5	(+)	11,7		10,4	(-)	11,9	
Spiser dagligt frugt	53,4	(+)	44,5	(-)	50,2		49,6		48,9	
Ryger dagligt	28,4		32,2	(+)	30,8		28,0	(-)	29,8	
Overskrider genstandsgrænserne for alkohol	16,4	(+)	14,2		12,0	(-)	14,3		13,4	
Begrænser alkoholforbrug af helbredsgrunde	18,3	(+)	17,0	(+)	7,2	(-)	8,5	(-)	11,7	
Brugt hash inden for 12 mdr.	16,6	(+)	5,7		6,8		7,0		6,4	(-)
Arbejde og bolig										
Arbejder på arbejdsplads med rygeregler	75,4	(+)	70,0		68,2	(-)	68,0		67,6	(-)
Stillesiddende arbejde i hovedbeskæftigelse	45,8	(+)	32,3	(-)	31,8	(-)	34,0		30,3	(-)
Tunge løft i arbejdet	27,0	(-)	36,8	(+)	37,7	(+)	33,6		38,6	(+)
Svært ved at nå arbejdsopgaver	29,3	(+)	24,5		26,3		24,9		25,3	
Generet af trafikstøj i boligen	11,0	(+)	6,5		7,0		6,7		5,8	(-)

Sociale relationer					
Træffer sjældent eller aldrig familie	12,5 (+)	9,7	10,5	10,1	7,9 (-)
Er ofte uønsket alene	3,1	3,3	3,1	2,9	4,1 (+)
Brug af behandling					
Kontakt til praktiserende læge inden for en 3-måneders periode	40,1	38,8 (-)	40,9	40,8	40,9
Kontakt til praktiserende speciallæge inden for en 3-måneders periode	11,0 (+)	7,1	6,0	5,8 (-)	5,3 (-)
Regelmæssigt brug af medicin	37,0	37,4	38,7	36,7	38,9
Alternativ behandling inden for 12 mdr.	24,4 (+)	23,8 (+)	23,8 (+)	20,1 (-)	17,2 (-)

*1 justeret procent vil sige, at køns- og aldersfordelingen i hver region er statistisk tilpasset befolkningens sammensætning på landsplan.

*2 signifikans (sig.): (+) og (-) viser om der er en statistisk påviselig forskel i forhold til et landsgennemsnit. (+) er over og (-) under.

Kilde: Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden 1987, Statens Institut for Folkesundhed, København, 2006.